

立复汀[®] 盐酸左卡巴斯汀鼻喷雾剂说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：盐酸左卡巴斯汀鼻喷雾剂
商品名称：立复汀[®]
英文名称：Levocabastine Hydrochloride Nasal Spray
汉语拼音：Yansuan Zuokabasiting Bipenwuji

【成份】

本品每瓶含主要成份左卡巴斯汀5毫克。
辅料为：丙二醇、无水磷酸氢二钠、一水磷酸二氢钠、羟丙甲基纤维素、吐温80、苯扎氯铵、依地酸二钠和纯水。

【性状】

本品为含微细颗粒的混悬液，静置后微细颗粒下沉，振摇后成均匀的白色混悬液。

【作用类别】

本品为抗过敏药类非处方药品。

【适应症】

过敏性鼻炎的症状治疗。

【规格】

10毫升:5毫克（按左卡巴斯汀计），每瓶100揅，每揅含左卡巴斯汀50微克

【用法用量】

本品在用前必须摇匀。
成人和儿童：常规剂量每鼻孔每次喷2揅，每日2次。也可增加至每次每鼻孔喷2揅，每日3~4次，连续用药直至症状消除。
患者在使用前必须清洗鼻腔（如擤鼻涕等），喷药时将药物吸入。第一次喷药前使气雾泵源充满，直至能很好地喷出气雾，然后再开始使用。

【不良反应】

1. 偶有使用本品后，出现暂时而轻微的局部刺激（鼻刺痛和烧灼感）的报道。
2. 上市以来，以下药物不良反应有很少的报告：过敏、呼吸困难、支气管痉挛、心动过速、鼻塞、鼻出血、头痛、眼睑水肿、疲乏、全身不适和用药部位反应（包括鼻部水肿和鼻腔不适）。

【禁忌】

对本品有过敏史者禁用。

【注意事项】

1. 肾功能不全患者应在医师指导下使用。
2. 本品无镇静作用，对精神运动性活动亦无影响。故汽车驾驶员和机械操作患者可以使用本品。需警告的是嗜睡仍可能发生，如发生该情况，应停止驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

3. 3岁以下儿童及老年人应在医师指导下使用。
4. 除非特别需要，孕妇不宜使用本品。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 临床试验中没有本品与酒精或任何其他药物产生相互作用的报告。在一次特殊设计的精神作用研究中，未见与安定有相互作用，但不能排除与酒精有轻微的相互作用。
2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

盐酸左卡巴斯汀是一种强效、长效、速效、具有高度选择性的组胺H1受体拮抗剂。局部应用于鼻部，几乎立刻起效，消除过敏性鼻炎的典型症状（喷嚏、鼻痒、流涕），作用可维持数小时。

【贮藏】

15-30℃保存

【包装】

塑料瓶装，10毫升/瓶，1瓶/盒

【有效期】

24个月

【执行标准】

进口药品注册标准：JX20160075

【批准文号】

进口药品注册证号：H20160305
分包装批准文号：国药准字J20160072

【说明书修订日期】

2016年8月24日

【生产企业】

企业名称：Janssen Pharmaceutica N.V.
生产地址：Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium
分包装企业名称：上海强生制药有限公司
Shanghai Johnson & Johnson Pharmaceuticals, Ltd.
分包装地址：上海市闵行经济技术开发区绿春路139号
邮政编码：200245
电话号码：800-8201188
传真号码：021-62824529

6100642

如有问题可与生产企业联系

Livostin[®]



3.5mm